

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

## AUVERGNE ET LIMOUSIN

SERVICE DE LA PROTECTION DES VEGETAUX

Cité Administrative, rue Pélissier

63034 Clermont Ferrand Cedex

☎ (73) 92-42-68



BULLETIN TECHNIQUE  
PUBLICATION PERIODIQUE

### Edition générale

### N°2

Le 26 Janvier 1984

### Traitements d'hiver des arbres fruitiers

La taille permet d'appliquer certaines mesures prophylactiques :

- Elimination des rameaux morts ou dépérissants porteurs de chancres, des pousses oïdiées, des fruits momifiés, des nids de chenilles...
- Désinfection des grosses plaies de taille ou de curetage des chancres avec une spécialité à base de mercure en badigeon (KANKERTOXY) ou en pâte (SANTAR).
- Destruction des déchets de taille contaminés.

Ne pas oublier de désinfecter fréquemment les outils de taille notamment en vergers de poiriers à proximité de zone contaminée par le FEU BACTERIEN (Limousin).

#### Faut-il effectuer un traitement ?

C'est au cours de la taille que l'arboriculteur doit décider de l'opportunité d'une telle intervention.

\* Ce traitement n'est pas indispensable chaque année

\* Il permet de combattre :

- les mousses, algues, lichens qui cachent différents ennemis plus dangereux,
- les cochenilles : insectes piqueurs suceurs munis d'un bouclier, affaiblissant les sujets contaminés et ne faisant souvent pas l'objet de traitements spécifiques en cours de végétation,
- les oeufs de pucerons, d'acariens notamment araignées rouges,
- les psylles sur poiriers,
- certaines espèces de chenilles défoliatrices.

P28.9



A

Bourgeon d'hiver.



B

Début de gonflement.

\* Il doit être effectué de préférence après la taille, pendant le repos total de la végétation (avant stade B) pour les huiles jaunes et les colorants nitrés, alors que les oléoparathions peuvent s'appliquer jusqu'aux premiers stades du débourrement (C - C 3)

\* Pour les produits utilisables, consulter le tableau ci-après.

Stades  
repères  
du  
Pommier



C



C3

Gonflement apparent.

# LISTE DES PRODUITS UTILISABLES EN TRAITEMENT D'HIVER

Matières actives	Spécialités commerciales	Firmes	REMARQUES
Colorants nitrés  (D. N. O. C.)	Trifina Bonitrol crème Jackyl S Sandoline A fluide Nitrugec Techn'ocolor	PENNWALT BOURGEOIS LITTORALE SANDOZ PHYTEUROP SIPCAM FRANCE	Actifs sur mousses et lichens, oeufs et larves d'insectes - cochenilles et psylles du poirier.  1 kg de P. C. / hl
Huiles  jaunes	Dytrol 50 <u>Véraline 3 fluide</u> Dinitrol 3 Seppic verger <u>Traitement d'hiver</u> <u>Elgetiver activé</u>	AGRISHELL PEPRO PROCHIM SEPPIC UMUPRO TRUFFAUT	Mélanges de colorants nitrés + huile de pétrole ou <u>d'huile d'anthracène</u> . Emploi de 2 à 3,5 l de P.C./hl. Très efficaces sur mousses et lichens, oeufs d'acariens et d'insectes - psylles du poirier. <u>Sur arbres à noyau, diminuer la dose de moitié.</u>
Phénol	Lysol 2	HOORMAN	Mouiller abondamment les arbres. Emploi à 4 l de P.C./hl-oeufs d'accariens et d'insectes
Huiles de pétrole	Oliocin Ovipron Euphytane Pestoil 7	BAYER R. S. R. SANDOZ SEPPIC	Peuvent être utilisées en traitement de pré-débourrement -efficaces sur cochenilles et oeufs de pucerons 2 à 4 l de P.C./hl. <u>Sur arbres à noyau réduire les doses de moitié.</u>
Oléoparathion	Nyvol CE 3 Oléo Bladan Ugecoil 10 Ugecoil P Pacol 4,5 Oléothion Techn'athion oil P Techn'athion oil PM	AGRISHELL BAYER PHYTEUROP PHYTEUROP RHODIAGRI SANDOZ SIPCAM FRANCE SIPCAM FRANCE	Pour une meilleure efficacité, produits à utiliser avant le départ de la végétation.  1,5 l à 3 l de produit commercial.

Les produits soulignés contiennent de l'huile d'anthracène très efficace contre les mousses et les lichens

\* L'application doit être réalisée par temps calme et ensoleillé, sans vent, ni risque de gelée. Pulvériser à la lance jusqu'au ruissellement l'ensemble de l'arbre.